

Volvac[®] AC Plus+ND+IB+EDSKV

Vacuna tetravalente inactivada contra las enfermedades de Coriza Infecciosa, Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Baja Postura.

COMPOSICIÓN:

Cada dosis de la vacuna contiene fracciones antigénicas de:

Coriza Infecciosa: *Haemophilus paragallinarum*
Serotipos A, B y C.....10^{8.0} EID₅₀/dosis
Newcastle (Cepa LaSota).....10^{8.2} EID₅₀/dosis
Bronquitis Infecciosa (Cepa Mass IB-41)
.....10^{6.7} EID₅₀/dosis
Síndrome de Baja de Postura (Cepa EDS-127)
.....1,000 HAU/dosis.

DESCRIPCION

Volvac[®] AC Plus ND+IB+EDS KV, es una vacuna tetravalente inactivada y emulsionada en aceite que confiere inmunidad contra las enfermedades de Coriza Infecciosa, Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Baja Postura.

El adecuado balance antigénico así como la concentración y contenido antigénico de su formulación permiten confiar en la efectividad de esta vacuna en las aves, debido las cepas adicionales en el serotipo B de la Coriza. Es un producto práctico que minimiza el costo por mano de obra y manejo de los animales y no inducen reacción adversa.

INDICACIONES:

Indicada en aves con un tiempo de vida larga (gallina de postura, reproductoras y progenitoras).

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Aplicar 0.5 ml por ave.

Aplicar vía subcutánea en el tercio medio dorsal del cuello. Aplicar antes de que las aves empiecen su ciclo de producción entre las 14 a 16 semanas de edad. La segunda dosis 4-6 semanas más tarde.

PRESENTACIÓN:



Fascos de 500 ml por 1000 dosis.

INSTRUCCIONES DE USO:

Retirar la vacuna del refrigerador 12 horas antes del proceso de vacunación, hasta alcanzar una temperatura óptima entre 28 a 35 °C antes de su aplicación.

Verificar la operatividad y exactitud del equipo de vacunación (jeringas) para asegurar que las aves reciban la dosis correcta.

Una vez que el frasco ha sido abierto, el contenido debe de ser utilizado en un lapso no mayor de 24 horas, la vacuna sobrante deberá ser desechada

PRECAUCIONES:

Vacunar únicamente animales sanos.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto bajo refrigeración, entre 2 a 7 °C. No congelar, no exponer a la luz directa.

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Registro SENASA N° B.01.2.01.I.0605

